

Medicinal Ingredients (per 1 mL)

Opitac™ Glutathione) 100mg

Non-Medicinal Ingredients: Water, glycerin, ethanol, phosphatidylcholine, tocopherol, medium chain triglycerides, natural chocolate flavoring, and natural mint oil

Recommended Use: As a source of antioxidants. Provides antioxidants that help fight, protect against, and reduce free radicals.

Recommended Dose: Adults: 1 mL (2 pumps) twice daily. Hold in mouth 30 - 90 seconds before swallowing. Take on an empty stomach, at least 10 minutes before meals. Once opened, use within 30 days.

Refrigerate upon receipt.

Recommended Duration of Use: Consult a healthcare practitioner for use beyond 8 weeks.

Risk Information: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.

Voir à l'intérieur pour le français

Manufactured by/Fabriqué
par: Quicksilver Scientific
1960 Cherry St.
Louisville, CO 80027

Importer/Importateur
DeVita Vite Ltd.
Box 283 Keswick ON
L4P 3E2 (800) 840-1676



QUICKSILVER
DELIVERY
SYSTEMS®

OPITAC™
is a trademark of KOWIN
Life Sciences Co., Ltd.

Product Code
Code produit: QSGCM01
15496.00

Lot:

Exp.:



QUICKSILVER
SCIENTIFIC®

LIPOSOMAL

GLUTATHIONE
+ CACAO MINT

GLUTATHION
+ MENTHE CACAO

NPN 80097336

Natural Health Product
Produit de santé naturel

50 ML LIQUID/(LIQUIDE)

PEEL HERE →

Ingrédients médicinaux (dans 1 mL)

L-glutathion (synthétique) 100mg

Ingrédients non médicinaux : Eau, glycérine, éthanol, phosphatidylcholine, tocofersolan, triglycérides à chaîne moyenne, arôme naturel de chocolat, huile de menthe naturelle poivrée

Usage recommandé : Comme source d'antioxydants. Fournit des antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres et de les réduire et de protéger l'organisme contre leurs effets.

Posologie recommandée : Adultes : 1 mL (2 doses) deux fois par jour. Retenir le produit dans la bouche pendant 30 à 90 secondes avant de l'avaler. À prendre à jeun, 10 minutes au moins avant les repas. Une fois le contenant ouvert, utiliser le produit dans les 30 jours.

Mettre au réfrigérateur dès la réception.

Durée d'utilisation recommandée : Consulter un professionnel de la santé si l'utilisation dépassera 8 semaines.

Renseignements sur le risque : N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.