

Medicinal Ingredients (per 1 mL)

L-Glutathione (synthetic)..... 100mg

Non-Medicinal Ingredients: Water, glycerin, ethanol, phosphatidylcholine, tocopherol, citrus limon peel essential oil, peppermint essential oil

Recommended Use: As a source of antioxidants. Provides antioxidants that help fight, protect against, and reduce free radicals.

Recommended Dose: Adults: 1 mL (2 pumps) twice daily. Hold in mouth 30 - 90 seconds before swallowing. Take on an empty stomach, at least 10 minutes before meals. Once opened, use within 30 days.

Refrigerate upon receipt.

Recommended Duration of Use: Consult a healthcare practitioner for use beyond 8 weeks.

Risk Information: Do not use if you are pregnant or breastfeeding.



**QUICKSILVER
DELIVERY
SYSTEMS®**

OPITAC™
is a trademark of KOHJIN
Life Sciences Co., Ltd.

Product Code
Code produit: QSGSH01
15051.05

Voir à l'intérieur pour le français

**Manufactured by/Fabriqué
par:** Quicksilver Scientific
1960 Cherry St.
Louisville, CO 80027

Importer/Importateur
DeVita Vite Ltd.
Box 283 Keswick ON
L4P 3E2 (800) 840-1676



**QUICKSILVER
SCIENTIFIC®**

LIPOSOMAL

**GLUTATHIONE
GLUTATHIONE**

NPN 80097336

**Natural Health Product
Produit de santé naturel**

50 ML LIQUID/(LIQUIDE)

Lot:

Exp.:



Ingrédients médicinaux (dans 1 mL)

L-glutathion (synthétique) 100mg

Ingrédients non médicinaux : Eau, glycérine, éthanol, phosphatidylcholine, tocofersolan, huile essentielle de citron (zeste), huile essentielle de menthe poivrée

Usage recommandé : Comme source d'antioxydants. Fournit des antioxydants qui permettent de lutter contre les radicaux libres et de les réduire et de protéger l'organisme contre leurs effets.

Posologie recommandée : Adultes : 1 mL (2 doses) deux fois par jour. Retenir le produit dans la bouche pendant 30 à 90 secondes avant de l'avaler. À prendre à jeun, 10 minutes au moins avant les repas. Une fois le contenant ouvert, utiliser le produit dans les 30 jours. Mettre au réfrigérateur dès la réception.

Durée d'utilisation recommandée : Consulter un professionnel de la santé si l'utilisation dépassera 8 semaines.

Renseignements sur le risque : N'utilisez pas ce produit si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.